

**НОВИНКА**



**Сорняки  
не пройдут!**





Комплит® Форте – новый довсходовый и послевсходовый гербицид для борьбы с однолетними двудольными и злаковыми сорняками в посевах зерновых культур (озимая пшеница и тритикале)



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Новая комбинация д.в. для контроля двудольных сорняков, в т.ч. *василька*
- Эффективен при довсходовом внесении
- Новый механизм действия на *метлицу*



## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Действующие вещества:** дифлюфеникан, 233 г/л  
флуфенацет, 200 г/л  
метрибузин, 83 г/л

**Препаративная форма:** концентрат суспензии (КС)

**Упаковка:** 4×5 л





## МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

- *Дифлюфеникан*, помимо прямого воздействия на взошедшие сорняки (листовое действие), проникает в корни и проростки прорастающих и взошедших сорняков (почвенное действие), а также образует устойчивый «экран» на поверхности почвы, препятствующий появлению «новой волны» сорняков. Почвенно-экранное действие сохраняется как осенью, так и остаточной весной, вызывая интенсивное обесцвечивание проростков или всходов сорняков и их последующую гибель.
- *Флуфенацет* обладает системным действием с переносом по апопласту и меристемным действием. Нарушает метаболизм жирных кислот и ингибирует деление и рост клеток.
- *Метрибузин* – системного действия, проникая в растение преимущественно через корни, перераспределяется в наземную часть и ингибирует фотосинтез сорных растений.



## СПЕКТР АКТИВНОСТИ

Двудольные и злаковые сорные растения, в т.ч. трудноконтролируемые: *метлица обыкновенная* (в т.ч. устойчивая к д.в. *изопротурон*), *подмаренник цепкий*, *падалица рапса*, *василек синий* и др.



**Василек  
синий**



**Подмаренник  
цепкий**



**Метлица  
обыкновенная**






## ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплит® Форте следует применять осенью в ранние фазы роста и развития сорняков:

- до всходов культуры
- в фазу «1 лист – начало кущения культуры»



### Длительной и надежной защите способствуют:

- мелкокомковатая структура почвы
- достаточная влажность до и/или после обработки
- отказ от весеннего боронования

### Не рекомендуется обрабатывать культуры:

- находящиеся под воздействием стрессовых факторов (засуха, избыточное переувлажнение, интенсивные осадки, высокие или низкие температуры – менее 8°C, заморозки)
- очень поздних сроков сева, уходящие в зимовку в неоптимальной фазе развития
- менее, чем за 2-3 недели до окончания вегетации
- при неоптимальной глубине посева семян





## СЕВООБОРОТ

### Последствие

При осеннем внесении ограничений по возделыванию культур в севообороте нет

### Замещающие культуры

В случае критического повреждения зерновых, обработанных гербицидом осенью, вследствие наступления неблагоприятных факторов можно высевать следующие культуры:

- сразу после применения препарата:  
*озимые пшеницу и тритикале*
- через 4-5 месяцев после внесения:  
*яровые пшеницу и тритикале, яровой ячмень*
- через 6 месяцев после применения:  
*горох, кукурузу, бобы, подсолнечник*
- нельзя в качестве замещающей культуры высевать:  
*сахарную свеклу и яровой рапс*


Если после повреждения основной культуры не проводится вспашка, в некоторых случаях на замещающих культурах может наблюдаться посветление семядольных листьев без последующего влияния на урожайность






## ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВ СОРНЯКОВ

Эффективность Комплита® Форте против сорняков в весенний период после осеннего применения на озимых зерновых, по данным исследований в Европейском Союзе, 2013-2014 гг.



Примечание: в скобках указано количество проведенных опытов

Эффективность различных норм расхода Комплита® Форте против сорняков в зависимости от фазы развития озимой пшеницы, по данным Небышинца С.С. и др., НПЦ НАН Беларуси по земледелию, 2015 г.



Примечание: основные виды сорняков в опыте – метлица обыкновенная, ромашка непахучая, подмаренник цепкий, фиалка полевая, горец вьюнковый и др.



**Эффективность Комплита® Форте против сорняков  
в СПК «им. В.И. Кремко», Гродненский район, 2015-2016 гг.**



Исходная засоренность, 22.09.2015



Состояние посева перед уборкой, 20.07.2016



Состояние посева перед уборкой, 20.07.2016





## РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ

| Культура                            | Вредный объект                                                                                                        | Норма расхода, л/га | Способ, время обработки                                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Пшеница и тритикале озимые          | Однолетние двудольные и злаковые, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х (метлица, ромашка, подмаренник, звездчатка и др.) | 0,4-0,6             | Опрыскивание посевов осенью – до всходов или в фазу 1-3 листьев культуры |
| Пшеница озимая                      | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х                                                              | 0,4-0,6             | Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры                      |
| Тритикале озимая с подсевом клевера | Однолетние двудольные и злаковые, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х (метлица, ромашка, подмаренник, звездчатка и др.) | 0,6                 | Опрыскивание посевов осенью в фазу 3 листа- начало кущения культуры      |
| Тритикале озимая                    | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х                                                              | 0,4-0,6             | Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры                      |
| Рожь озимая                         | Однолетние двудольные                                                                                                 | 0,4-0,6             | Опрыскивание посевов осенью до всходов - в фазу 3 листьев культуры       |
| Ячмень озимый                       | Однолетние двудольные и злаковые                                                                                      | 0,4-0,6             | Опрыскивание посевов осенью в фазу 3-4 листьев культуры                  |

### Кадыров Андрей Михайлович

Руководитель отдела маркетинга

+375 29 613 70 68

andrey.kadyrov@bayer.com

### Ерчик Валерий Михайлович

Специалист по маркетингу

+375 29 156 98 06

valery.yerchyk@bayer.com

### Данилевич Юрий Владимирович

Специалист по маркетингу

+375 29 376 31 28

yury.danilevich@bayer.com

### Таргонский Сергей Иосифович

Менеджер по развитию, направление «Семена»

+375 44 566 98 80

sergei.targonski@bayer.com

### Шедько Владимир Николаевич

Специалист по регистрации

+375 29 664 16 17

uladimir.shedzko@bayer.com

### Корнель Евгений Викторович

Специалист по маркетингу, Гродненская область

+375 29 609 59 74

yauheni.karnel@bayer.com

### Тарасенко Владимир Сергеевич

Специалист по маркетингу, Брестская область

+375 29 332 50 16

uladimir.tarasenska@bayer.com

### Старовойтов Дмитрий Сергеевич

Специалист по маркетингу, Минская область

+375 29 6805225

dzmitry.staravoitau@bayer.com

### Юзефович Андрей Иванович

Специалист по маркетингу, Гомельская область

+375 29 123 01 95

andrei.yuzefovich@bayer.com

### Осмоловский Евгений Сергеевич

Специалист по маркетингу,

Витебская и Могилевская области

+375 29 6836821

yauhen.asmalouski@bayer.com

Быстрый переход  
на онлайн страницу продукта:



Bayer

ООО «Байер ВР»

220089, г. Минск,

пр. Дзержинского, д. 57, оф. 54

Тел.: (017) 239-54-20

Факс: (017) 336-12-36



[www.cropscience.bayer.by](http://www.cropscience.bayer.by)