



Солигор®

Скорая помощь Вашим посевам!



Солигор® – новый трехкомпонентный фунгицид для защиты зерновых и бобовых культур от основных болезней

Преимущества

- Максимальная эффективность против мучнистой росы
- Высокая эффективность против септориоза и прикорневых гнилей
- Надежен в условиях пониженных температур и засухи
- Превосходная защита от болезней с фазы начала выхода в трубку

Характеристика препарата:

Препаративная форма: концентрат эмульсии (КЭ)

Действующее вещество	Химический класс	Концентрация
Протиоконазол	триазолинтионы	53 г/л
Тебуконазол	триазолы	148 г/л
Спироксамин	спирокеталамины	224 г/л

Канистра: 5 л

Механизм действия

Солигор® – системный фунгицид защитного, лечебного и искореняющего действия.

Препарат ингибирует процесс деметилирования биосинтеза стеролов на различных уровнях и нарушает избирательность проницаемости клеточных мембран патогена

Спироксамин, кроме фунгицидного действия, **ускоряет** проникновение в ткани **протиоконазол** и **тебуконазол** даже при пониженных температурах воздуха

протиоконазол × «реактивный»
спироксамин = «быстрый»
протиоконазол

тебуконазол × «реактивный»
спироксамин = «быстрый»
тебуконазол

Солигор® – инновации, умноженные на скорость!

Формула эффективности

$\left(\begin{array}{l} \text{инновационный} \\ \text{протиоконазол} \\ + \text{надежный} \\ \text{тебуконазол} \end{array} \right) \times \text{«реактивный»} \\ \text{спироксамин} = \text{Солигор®}$

Механизм действия

Солигор® – не даст патогенам времени на «раскачку»!

Солигор® уничтожает возбудителей заболеваний на всех стадиях их развития. Сочетание трех действующих веществ из разных химических классов исключает риск возникновения резистентности, расширяет спектр действия и позволяет эффективно бороться с большинством болезней в посевах зерновых культур.

Протиоконазол




Спироксамин



Тебуконазол



Прорастание



Рост




Инфицирование



Мицелий



Спороношение



Протиоконазол



Спироксамин



Тебуконазол



Особенности применения

Уникальное сочетание д.в. и надежная формуляция обеспечивают Солигору® «гибкость» по срокам применения, быстрое действие и высокую эффективность в трудных погодных условиях.

Солигор® – всегда быстро, всегда вовремя!

Фунгицид можно применять на разных стадиях развития культуры в зависимости от восприимчивости сорта, времени появления заболевания и запланированной системы защиты:

- при ранневесенних обработках – с фазы «начало выхода в трубку», когда температура ниже +12 °С
- для защиты «флаг-листа» – в одно-, двух- и трехкратных системах фунгицидной защиты зерновых культур

Спектр активности

Мучнистая роса, септориоз, гельминтоспориоз, сетчатая пятнистость, полосатая пятнистость, пиренофороз, ринхоспориоз, виды ржавчины, фузариоз, прикорневые гнили и др.



мучнистая роса



септориоз



сетчатая
пятнистость



ринхоспориоз



бурая
ржавчина

Куда «встроить»?

Наивысшая эффективность достигается при профилактическом использовании фунгицида или при появлении первых признаков заболеваний.

однократное внесение, урожайность – до 40 ц/га

2-кратное внесение, урожайность – 40-70 ц/га

3-кратное внесение, урожайность – более 70 ц/га

Соли
фунгицид

Солигор
фунгицид
0,6-0,8 л/га

0 7 9 10 12 13 21 29 30 31 32



Применение на ранних стадиях позволяет использовать более низкую дозировку без потери эффективности

Солигор
фунгицид

0,6-1,0 л/га


гор
0,6-1,0 л/га

Зантара
фунгицид
0,8-1,0 л/га

ПРОЗАРО
фунгицид
0,8-1,0 л/га

Скайвэй Хпро
фунгицид
1,0 л/га

ПРОЗАРО
фунгицид
0,8-1,0 л/га
Скайвэй Хпро
фунгицид
1,0 л/га



37

39

49

51

59

61

69

71-92

Эффективность против мучнистой росы

Эффективность против мучнистой росы на **озимой пшенице**
(НПЦ НАН Беларуси по земледелию, г. Жодино, 21 мая 2012 г.)




Солигор®, 0,8 л/га в ф. 30-31 – начало выхода в трубку



Контроль



Продолжительность защитного действия Солигора® против болезней на **озимой пшенице**, обработка в ф. появления флаг-листа
(РУП «Институт защиты растений», сорт *Сюита*, 2011 г.)




Эффективность против **мучнистой росы**

Прибавка к контролю!

Солигор® 0,8 л/га +8,1 ц/га!

Эталон 0,6 л/га +4,7 ц/га



Эффективность против **септориоза**

Эффективность против сетчатой пятнистости

Эффективность фунгицидов против сетчатой пятнистости **ячменя**
при двукратной обработке
(НПЦ НАН Беларуси по земледелию, г. Жодино, 19 июля 2013 г.)



слева: Солигор®, 0,8 л/га – по флаг-листу, Прозаро 1,0 л/га – по колосу
справа: контроль




слева: Солигор®, 0,8 л/га – по флаг-листу, Прозаро 1,0 л/га – по колосу
справа: контроль




Превосходная защита флаг-листа – основа для безупречной защиты колоса!

Биологическая и хозяйственная эффективность двукратных схем фунгицидной защиты против сетчатой пятнистости ячменя (1-я обработка – флаг-лист, 2-я обработка – колос), НПЦ НАН Беларуси по земледелию, г. Жодино, 2012 г.



Солигор® – прочное звено в надежной цепи!



Регламенты применения

Культура	Вредный объект	Норма расхода	Кратность обработок
Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	0,6-1	1
	Фузариоз колоса	0,8-1	
	Септориоз колоса	1	
Пшеница яровая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, септориоз листьев	0,6-0,8	1
Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	0,6-0,8	1
	Фузариоз колоса	0,8-1,0	
Озимый ячмень	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость	0,6-0,8	1
Рожь озимая	Ринхоспориоз, мучнистая роса	0,8-1,0	1
Тритикале озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, септориоз листьев	0,6-0,8	1
	Фузариоз колоса	1	
Тритикале яровая	Септориоз листьев	0,8	1
Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	0,6-0,8	1
Рапс яровой	Альтернариоз, склеротиниоз	0,6-0,8	1
Горох посевной	Аскохитоз	0,8	1
Люпин узколиственный	Антракноз, бурая пятнистость	0,8	1
Бобы кормовые	Альтернариоз, фузариоз, черноватая пятнистость, ржавчина, шоколадная пятнистость, ложная мучнистая роса	0,6-0,8	2
Лен-долгунец	Антракноз	0,3-0,4	2

Быстрый переход
на онлайн страницу продукта:



Bayer

ООО «Байер ВР»
220089, г. Минск,
пр. Дзержинского, д. 57, оф. 54
Тел.: (017) 239-54-20
Факс: (017) 336-12-36

BayerCropScienceBelarus 

bayercropscience_by 

Bayer Crop Science Беларусь 

www.cropscience.bayer.by

